

檢查室介紹

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071新竹市光復路二段690號

電話：

03-5166868 · 03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

· 健康諮詢專線：03-5745098

週一～週五 上午 9:00~12:00

下午14:00~17:00

週六至中午12:00 · 例假日休息

· 語音掛號電話：03-5166516

· 人工掛號電話：03-6118866

週一～週五 上午 8:00~17:00

週六 上午 8:00~12:00

內視鏡室介紹

修訂: 2023/07/31

生理檢查科



新竹馬偕紀念醫院

Mackay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.
馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

★胃鏡檢查

一、檢查目的

利用內視鏡檢查食道、胃及十二指腸有無不正常之病兆，如腫瘤、潰瘍、炎症、癌症病變、腫塊、出血，並可立即切片取樣，或執行電燒、注射止血針止血等治療。

二、檢查流程

1、檢查前：

- 檢查前6-8小時不能吃任何東西（含藥物及水）。
- 備妥胃鏡檢查單、同意書及健保卡至內視鏡室報到。
- 檢查前取下眼鏡及活動假牙，以免發生危險。

2、檢查中：

- 喉嚨噴局部麻醉藥及肌肉注射腸胃道鬆弛劑(必要時再給予)
- 檢查時採左側臥姿，嘴巴咬住咬口器，以鼻吸氣、用嘴哈氣，勿用力咳嗽及吞嚥動作，以免噎到。
- 檢查過程中有噁心想吐的感覺是正常的，可做深呼吸減輕不適感。

三、檢查注意事項

- 喉嚨若有不適感，為局部麻醉藥之作用，約一小時內會消失，請勿大力清喉嚨，以免造成疼痛受傷。
- 檢查後30分鐘請先試著喝水，若無噎到即可恢復正常飲食；若有施行切片檢查，請一小時後再進食。

3、檢查後常伴有腹脹情形，請多走動以利排氣，若腹脹、腹痛加劇或解大量黑便情形，請返診就醫。

4、檢查前若施打腸道鬆弛劑，部分病患會出現視力模糊、心跳變快情形，請勿開車及騎車，以免危險。

★大腸直腸鏡檢查

一、檢查目的

利用內視鏡檢查病人的結腸內可能的病兆(如潰瘍性結腸炎、出血源、瘻肉、腫瘤或阻塞...等情形)，以便進一步處置或治療。

二、檢查流程

1、檢查前：

- a.備妥大腸鏡檢查單、同意書及健保卡至內視鏡室報到。
- b.依照指示檢查前一天服用瀉劑並大量喝水，排空糞便。
- c.檢查當日請去除身上的金屬或貴重飾品。

2、檢查中：

- a.檢查時採左側臥姿勢，有時需配合醫師指示更換姿勢。
- b.隨著管子進入，鼻子吸氣，嘴巴哈氣，肚子勿用力。
- c.大腸鏡進入腸子轉彎處，或曾經腹部開過刀的病人，會覺得較為疼痛。
- d.為了使腸道看得更清楚，醫師會打一些空氣到腸子裡，因此肚子脹脹是正常的。

三、檢查注意事項

1、檢查後如有腹脹、腹痛等感覺，這是醫師檢查過程中腸道被內視鏡牽扯，及打空氣到腸道內所致，請多走動以利排氣，症狀即可改善。

2、無頭暈、嘔吐、腹脹嚴重之情形即可進食，因腸氣未消，故檢查後當天食量先減半為宜。

3、如有劇烈腹痛、盜汗、血便、黑便等任何無法忍受的腹部不適情形，請儘速返診(緊急情況可先到急診)；住院病人則應立即告知醫護人員。

4、若有瘻肉切除者，飲食需於三天內進食流質食物如牛奶、豆漿、豆花、稀飯湯，第四天以稀飯、麵條為主。五天內避免進食高纖食物如蔬菜、水果、菜梗、較硬食物及容易發生腹瀉的飲食(如生食海鮮或嗆辣食物等)。服用抗凝血劑或阿斯匹靈者需先告知醫師，必要時須先停用。

5、若有使用減痛檢查之病患，檢查後會有頭暈、噁心想吐、昏睡無力感、家屬需全程在旁陪伴，並注意其安全預防跌倒，勿讓病人自行站立、自行上廁所，需先休息一小時後待症狀改善，

6、有使用藥物減痛患者檢查後，不可自行開車或騎車返家。



★檢查內視鏡逆行性膽胰管攝影術

一、檢查目的

經由內視鏡方式做膽管、胰管疾病的診斷及治療，檢查範圍包括膽囊，總膽管，肝內膽管和胰管。

二、檢查流程


需住院中執行，檢查地點放射科。

1、檢查前：

- a.需禁食6-8小時（含藥物及水）。
- b.病患服反穿，開口於後背，卸除活動假牙、金屬物品。
- c.靜脈注射點滴。

2、檢查中：

- a.喉嚨噴局部麻醉藥、經醫師評估視需要給予鎮靜止痛及腸胃道鬆弛劑。
- b.檢查時採趴睡姿，嘴巴咬住咬口器，以鼻吸氣、用嘴哈氣，勿用力咳嗽及吞嚥動作，以免嗆到。
- c.裝置生命徵象監測儀，並提供氧氣鼻導管使用。



三、檢查注意事項

- 1、檢查後視情況需禁食幾小時或隔天。
- 2、住院觀察是否有合併症發生，如出血、膽管炎、胰臟炎、膽囊炎、腸道破裂。