

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

hcservice@mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865  
週一～週五 上午 9:00~12:00  
下午 14:00~17:00  
例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866  
週一～週五上午 8:00~17:00  
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2017/11

小兒科部



## 新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

- 一、 熱性痙攣(Febrile convulsion)：指患者急性體溫升高至某程度而併發之痙攣，但不包括中樞神經感染疾患所引起的。熱性痙攣發生時，必須尋找並治療發燒原因。
- 二、 發生率：每 20 到 40 位兒童中就有一位。年齡分佈主要為 6 個月至 5 歲間；尤其是 9 個月至 2 歲之間。家族裡有此症者，更易有熱性痙攣。
- 三、 症狀：發熱 24 小時以內發生，發生抽搐多為全身性；兩眼往上吊、嘴唇發紫、牙關緊閉、口吐白沫，可能失去知覺。有 50% 於 5 分鐘內會停止。
- 四、 患者在發作時多數呈異常腦波，但 1 星期內異常腦波會消失；所以安排腦波的時間要在發作一週到 10 天後。
- 五、 對於發作次數少的病童，初期可予藥物(valium)，防止發作。倘若發生痙攣的次數超過了四、五次，就會給予抗癲癇藥物；為期兩年。

新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。